


Jon Thorsteinen:

Um

Qvef-Landfarsött.

Videy 1834.



614
JSM

151

16

1834.

Stutt og einföld

Aviðan

um

Medhöndlan

Qves = Landfarsföttar,

af


J. Thorsteinson

Landphysicus.



Videyartúanstrí, 1834.

Prentað á opinberann kostnað,
af Bólfrjóðjara Selga Selgafyni.



§. 1.

Qves-Landfarsfótt sú, er í næstlidinn Mánuð hefir geingid og ennú geingur yfir Gullbringu-sýslu, og nálægar Sveitir, er samkins og Qveffóttir þær, er opt áður hafa geingid hér yfir landid, þó er þessi mannskjædarl enn þær opt hafa verid, helst á gamlalmennum, edur þeim af yngra fólki, er áður hefir heilsuveikt verid, einkum brjóstveikt edur hast hefir einhverskonar innanmeið, edur flæma adhjúkrun.

§. 2.

Sótt þessi byrjar gjarnast, sem adrar Qvesfóttir, med meiri edur minni höfudverk, magnleysi í líkamanum, lystarleysi, hósta og hæsi, er stundum káinur strax, stundum nockru seinna, á sumum med miklum höfudþýngslum, hlustarverk, edur hálsbólgu, hita edur kulda—stundum til skiptis—sijótum æðaslætti, verkjartökum, helst í brjóstinu, ósmeci í munni, seidingsverkjum hér og hvar um líkamann; med

hóstanum geingur optast upp nokkur slímfroða, á sumum með graftarlit, og s: fr: Flestir hafa ekki öll þessi kénnumerki í einu, og sum aldrei; á sumum kénmur eitt þegar annað batnar, margir fá og ekki meira af sóttinni, enu nokurn hofudverk, þyngsla máttleysi í kroppnum, sem endar með hósta og nokkrum uppgangi, eptir því verður að hafa ýmislega meðferð á sjúkdóminum.

§. 3.

Bestu varðar, að gæta orðid sér fyrir að fá sjúkdóminn, og er það sumum ónægulegt, þó alla varðid viðhafji, en þó má mikid til þess gjöra að varast hann, annaðhvort að fullu, eða svo, að þarvid verði lítid af honum, og er það eiukum og sérbeillís:

- 1^o að flæða sig vel, halda sér jafnheitum, hafa þurur og heitar fætur, og allann flæða að búnað góðann.
- 2^o Dorda hóflega, og heldur léttan mat enn þúngan, drekka á qvöldin heitt thevatn af blóðbergi eða heita misu.
- 3^o Drekka ekki mjög áfcinga drycki, og jafnframt ekki Kaffe.

4^o Halda maganum hreinum, og er því gott — þegar sóttin er að byrja—syrir þá er enn eru frískir, annadhvert að selja upp einusinni, ef tunga þeirra er óhrein, og sjúkdómurinn byrjar með lýstarleysi, eða brúka eitt sinn búkþreingsandi meðal, sem einfarvel passar þeim, er áður að undansöfnu er hætt við, hardlífi.

5^o Miklar næturvökur og erfíði um megn frammi, flyldu menn varast, ef hjá verður komist,

§. 4.

Þegar menn hafa feingib sóttina, verður ýmislega með að fara, eptir sem henni er varid. Þeir sem ekki eru þýngtra haldnir enn svo, að þeir hafa nokurn hósta—er þó ei hindrar svefain—mátt: lensi, linleika og lýstarleysi, en gæta þó verid á fótum, þurfa optast eingin sérdeilis læknismedöl önnur enn að þeir klædi sig vel, haldi sér jafnheitum á næturnar, bordin lítid, drecki eitthvad heitt á quöldum er þeir ganga til sængur (sjá §. 3.) brúki heitt fótabað á quöldin, ef höfudþýngslí eru nokur með, og varist að standa upp úr rúminu, þegar þeir eru mjög sveittir; varist hardlífi, sem opt má bæta með heimilissjúla, annadhvert blöðum hans, er meiga brúlast í graut á sama hátt sem kálblöð, eða af

vatni því er njólarætur eru sóðnar í, en þeir sem til meðala gæta náð, brúka í þess stað Laxersalt, hvar af 3 lóð, uppleyst í heitu vatni, er flestum full-ordnum nógur skamtur, eda önnur alþæft opnandi meðöl.

§. 5.

Þættulegri er sóttin ef henni fylgir takverkur í brjósti, annadhvert strax í byrjun hennar, eda hann kémur seirna, sem ver vid hóstann, og verður opt óþolandi. Vid slíkum tókum skal blóð taka á handlegg, svo fljótt sem verður, og batni ei takid strax tæluverdt vid eina blóðtöku, má taka blóð í annad sinn, einkum ef það fyrsta blóð sem tekið var, hefur á sér gula, þykva og seiga skán, er það kólnar, því það eru merki til, ad takid er því megnara og þættulegra, sem sú gula blóðskán, er seigari og þykvari; má eptir blóðrifi, og kroprum hins slika, ítreka blóðtökuna 2ar eda 3ar, allt eptir sem takinu línat, og blóðinu er varid, sem aðgætist þegar það kólnar.

§. 6.

Sumir fá bólgu med stíngverkjum innantí hálsinn, svo þeir gæta ei rent niður, þeim skal og

blód taka á handlegg einusinni eða optar, eptir því sem hálsbólgunni er varid, og eptir því hvað þick og seig blóðskáni er. Sama er að seigja um mjög mikiu hlustarverk, er stundum gétur orðid hættulegur, og er þá varlegra að taka blód við honum.

Þess má og géta: að vanalegt er, að láta blæða hérum bil þela í hvert sinn á fullorðnum, þó má, ef blóðrikum manni er tekið blód í fyrsta sinni, við mjög sáru taki, vel láta blæða, framt að hálfum æðrum þela, því þar vid liuast stundum takið svo mikið, að ecki þarf optar blód að taka. Ef úngslugum er blód tekið, verður það að vera minna, eptir aldri þeirra.

§. 7.

Vinist ecki takverkur að fullu eptir eina eður fleiri blóðtökur, má leggja spansflugna:plástur, annadhyvert á þann stad hvar takið er, ef það er undir annari hverri síðu, eða á utanverðann upphandlegg, á þeirri hlid er takið er, þó skal aldrei leggja spansflugna:plástur, rétt yfir þann stad, á vinstri síðu, hvar hjartad finnst slá undir, heldur annadhyvert utan á síðuna, eða upp undir vidbeinið, ef verkurinn er þar, en sé hann í midju brjósti, má leggja hann milli herðarbladanna, eða þar á

bakinu, sem nálægast er verkinum; á hægri hliðinni má allstadar leggja plásturinn hvar verkurinn er undir. Yfir höfund er þó varúðarverdt: að aldrei sé spansflugna;plástur lagdur á tafverf í brjósti, nema hann ádur sé linadur vordin við blóðtöku, eða að blóð hafi tekið verið, og hafi blóðið ekki haft þá gulu, seigu himnu sem nefnd er í § 5; því ef blóðið er kalda, náttúrulega rautt að lit ofaná, er það merki til að fleiri blóðtokur gagna ekki við þessháttar verk, og má þá strax brúka spansflugna;plásturinn, því þá er verkurinn annarar artar—*o*: *rheumatismus* eða *rheumatalgia*—hvar við blóðtöku gagnar minna.

§. 8.

Éf blóð tekið við hálsbólgu, hvar við hún linar nokkuð, en batnar ei til fulls, er gott að leggja bakstur af volgum drabla með feiti í, eða aðra þesskonar mýkjandi bakstra að utanverdu við hálsinn; ef bólga þar við kemur útvortis í hálsinn, minskar hún gjarnan að innanverdu, og er það þvi góðs merki; sama má og gjöra við litla hálsbólgu er ekki hindrar að nokkuð má niður renna, og þarf þó ei altjend að taka blóð við henni, ef hún sljótt líuast við baksturinn.

Við ítrilsforlegann eyrnaverf nægir optast að vata ullar;þvegil í Kamförudropum og stínga inni

eyrad, en verði hann mjög mikill, má taka blóð
eptir §. 6.

§. 9.

Æ sumum legst sóttin mest í höfudid, fyrst
med miklum þýngslum og verkjum í hefði, síðan
óræði, stundum med svefnleysi, og miklum órólegi
heltum í kropnum; við þessa er aðgætandi: hvert
túngan er hrein eða óhrein, sé hún mikil
óhrein med gulleitri skorpu, og sá veiki aldeilis frí
af taki eða stíng í brjóstinu—og hafi ei uýlega hafi
tak eða blóðspýting—er ráðlegt að taka einusinni upp:
sólunedat; sé túngan þarámóti hrein og raubleit,
lifæðin fljót, hærð og mjó, og sá veiki med aði,
svo hann heldst ei í rúminu, má taka einusinni
blóð á handlegg, sofni hann þá og verði rólegri
eptir blóðtökuna, má síðan gefa honum fjatandi,
eða temprandi púlver, ef tli er, 2 thesleidar hvern
eiftartíma, og sé þá blóðhlaupid náttúrulega raude
ofan, þarf ei að taka optar blóð; sé það þarámóti
med þykri og seigri slán, gulleitri að lit, má
írreka blóðtökuna, eins og áður er sagt um tók í
brjóstinu; hafi túngan þarámóti verid óhrein, og
uppsóluvatn brúfad, sofnar sá veiki optar eptir upp:
sóluna, en batni ecki höfudverkurinn þar við, má

leggja spanstflugna-plástur aptaná báða kálfana nedantil, sem plagar að léttu höfudþýngslin; samslagsplástra má og leggja aptaná kálfana á þeim, er hafa þesskenar höfudþýngsli, er orsaka þeim mikinn og lángvinnan svefn.

Við alla þá er veikir eru, er aðgjætandi: að þeir hafi hæðir góðar til bakksins, má þar til best brúka stólpípn, hvar ecki verður öðrum hægt opnandi meðlolum náð, og atti aldrei að líða fleiri enn 2 dögur milli þess þjúklungurinn feingi þær.

§. 10.

Nockrir þjáft mest af brjóstþýngslum og mæði sem eplst við höstaköstin, áu þess þeir þar við fáu tölverda verki, edur neina fasta stíngi, en stundum nockur höfudþýngsli; hafi þessir mjög óhreina tungu, og hafi ei áður brjóstveikir verid, eda blóðspýting haft, er þeim betra að brúka í fyrstu uppsólumedal, eda ef þeim heilbrigðum hættir við hardlífi, meiga þeir einóvel brúka eitt Laxermedal, sjá §. 4.

Seð uppgangur tölverdur frá brjóstinu, verda þvillit brjóstþýngsli skjaldan hættuleg yngra fólki, má og við þeim leggja spanstflugur utaná báða upphandleggina, hvarvid þeim nockud plagar að léttu, þessum er og gott að halda sér í rúminu meðan

Þeir eru verstir, drecka jafnadarlega heitt, hvar vid er ætlad til þeir svitni, ef þeir undireius þekja sig vel í klæðum, því tölverdur sviti, léttir gjarnan þesskonar brjóstþýngslum.

§. 11.

Aðrir klaga mest yfir hitaseidíngi í kroppnum, og miklum beinverkjum um allann líkamann, þessum er og hollt að svitna með því, að drecka opt volga dröfki, og ef þeir gæta feingid temprandi kamfóru-púlvur (∴ *pulvis temperans champhoratus*) vid að brúka þar af 1 eða 2 thesleidar í einu, hérumbil hvern eiftarríma, sem tekid er inn í matspæni af vatni. Sé tunga þeirra óhreín, með gulleitri, eða nýsög þyktri hvíttri skorpu, meiga þeir selja upp einusinni eða að ødrum kosti, brúka eitt Laxermedal.

§. 12.

Þeir sem þjást mest af sífeldum hósta, án þess þeir hafi tafverk með, batnar opt nockud vid að svitna mikid, á sama hátt sem áður er sagt, og sé upp-gángur mikill með hóstanum, meiga þeir eeki vel án hans vera, því annars vara þýngsli fyrir brjóstinn, af slímhroda er þar safnast fyrir, ef hóstinn er minni

enn þarf, til þess að uppgangur frá brjóstinu viðhaldist.

Gangi þar á móti lítid eða ekkert upp frá brjóstinu með hóstanum, má lina hann ef verður, hvar til best þénar brjóstpulver það er samanstendur af sífri, og einn eður tveimur grönnum—byggforna þýngd—af *opio* sem optast þeir einir gétu feingid er ná til lækna, eða þarf optast lækni-reglur fyrir hversu sterk þau skuli vera, og hversu opt brúkaft eptir hins veika aldri og ásigkomulagi.

Ef takverkur viðheldst í brjóstinu, eptir að tekid er blóð, eptir §. 5, sem espast og vestnar við þrálát hósta: kóst, hefi eg með heppni brúkað *Mercurialpulver* með *opio*, sem og svo þeir einir gétu feingid er ná til lækna. Það samstendur

af: *Mercurii dulc:* gr: XII.

Opü puri: gr: X.

Gummi Arab: gr: XIV,

Sachari albi: 3I.

exacte misce, divide in VI. pulveres æquales.

Af þessum smá pulverskamtum, má gétu fullordnum inn í vatni, einn samt hvern eiktartíma, hvar við hóstina og verkurinn optast linar svo fljótt, að skjaldan þarf að brúka fleiri enn 6 smá pulver, en þar slík meðal ecki er að fá nema hjá læknum,

er best í hvert sinn að fá reglur um brúkun þeirra, og alla þaradlütandi meðferð.

§. 13.

Af því eg hefi opt áður gétid um brúkun uppsölumedala, vil eg stuttlega nefna þau tilfelli hvor þau skal varast að brúka. Oléttum konum og þeim er rétt nýlega hafa börn alid, slyði aldrei gésa uppsölumedal, ekki heldur þeim sem hafa sárann sting eða tafverk, hvert heldur er í brjósti eða nedar í lifinu, ekki heldur þeim er hafa blóðspýting, edur hafa nýlega haft hann, því allir þessir géta haft mikinn skada og heilsu; eða líf; tjón af stertri uppsölu, þó gét eg ei neitad, að lækningar stundum í háskalegum tilfellum máské brúka uppsölumedal í einhverjum af þessum fringumstæðum, en það yrði bæði oflángt hér að lýsa nákvæmlega, hversu sjúkdómium þá mætti vera varid, enda er víssast fyrir alþýðu, að halda sér við þessa reglu, aldrei að gésa neinum þessara uppsölumedal, án læknis vitundar og ráða.

§. 14.

Fátínir hafa, í byrjun sóttarinnar feingid megn uppköst, sem þó optast minka við að drekka kalle vatn, adrir hafa nidurgang, sem ekki er verdt að stoppa, sé hann ei því meiri, sem mjög skjaldan hefur verid í þessum

ari sótt; við honum er og gott að drekka kaldr vatn, en slyði meiri meðala viðþurfa við þessi tilfelli, sefast hvert um sig gjarnan við að brúka lítið *opium*, eður nokkra svefndropa—12 til 20 dropa 3^a hvern tíma—jafnframt köldu vatni.

§. 15.

Þegar sóttin er að mestu bótud, hafa sumir þó um nokkurn tíma þmsar leyfar hennar eptirleidis, svo sem lángrandi máttleysi og linleika í líkamnanum, bjúg í fótum, og heyrnardeyfu. Máttleysid minkar gjarnast af sjálfu sér þegar sóttin er í afréun, við hentugt mat; lífi og adhjúkrun, þó það á stundum gangi nokkud seint.

Við bjúg í fótum, er gott að drekka af enirberjum, sem áður eru vel þurkud og mulin, annadhvet sem thesgrasi, við að hella 1 mörk sjóbandi vatns, á 2 lóð þeirra í einu, láta svo standa um stund, og drekka þegar kalt, eða máttulega kalt er orðid, ellegar við að sjóða þau í katli sem Skaffe, láta svo seydid kólna á þeim, og drekka síðan er það er kalt orðid, það er þvagleysandi og eydir bjúg og vatnsþýfi. Við heyrnardeyfu er viðhelt eptir sóttina, er gott að leggja spansflugnaplásteur, bak við það eyra, er heyrnina hefur mist, eða aptan við bædi, ef bædi eru dauðheyrd.

§. 16.

Fyrir þá er eru í bata eptir sóttina, er athugað verdt: að þeir, öllu fremur varist kulda, því þar við

æfist opt hóstinn, og vestnar aptur ad nýu, er því þá ad adgjæta allt hid sama sem nefnt er í §. 3. um ad varast sóttina; einkum og sérbeiliðlega varðar um, ad menn klæði sig vel, standi ei í votum sótklæðum, eda séu ei, í hid minnsta, vorir til leingdar, ofþreyti sig ei á erfíði eda næturvökum og ofþýngi ecki magann, med ad borda mjög þúnga sædu, sem er reikt eda saltad kjöt, súrt skir, feitur mjólkurmat, og hørð eda gømul fiskæti. Þetta sædu falla menn þarómóti: mælvatns grauta, kálgrauta, nýan fisk og siling sodin, sjallagræs, misu, og jafnvel þunnar kjötsúpur af nýu kjöti, hún: íslegar grjónasúpur, og annann kornmat.

A einstaka manni endar sóttin med vidvarandi layering, sé hún ei sjarðkamikil og verkjalítill skal ei flýta sér ad stoppa hana, einkum ef brjóstþýngslí og hósti þar vid endast, en vari slíkt mjög leingi og dragi magn úr þeim veikta, má lækna hana med sundmögum sodnum í vatni, svo þeir verdi vel limandi, og bordast þeir svo med litlu af smjóri; líka verkun hæsir og vatn það, sundmagar eru lúmsodnir í; líka má brúka sterkt seidi af fortulingi sem medal móti líffýki ef það er jafuadarlega drukkid; Þrisgrjónagrannt med raudavíni í géta og þeir brúkad er það hafa.

§. 17.

Þótt hér séu nefnd öll þau helstu og hættulegustu tilfelli er fylgja þessari sótt, svoléidis sem hún

hér hefir verið um hríð, gæta bæði ýmisleg önnur upptökmið, eptir því sem hinna velku hellsufari er varið, tilka umbreytast opt þvilikar sóttir, eptir sem þær færast yfir landið, verða á stundum miklu vægari þar, er þær koma seinast, enn þær voru í fyrstu, eða umbreytast svo, að þær að lokunum verða að annarslags landsfar sótt enn þær voru í fyrstu, yrði því oflángt og hart að ómögulegt, á litlum tíma, og í stuttu máli að gjöra ráð fyrir öllum þeim elustaka tilfellum er fyrir kynnu að koma, enda er og allra þeirra hér gétid, er optast og helst fylgja bæði þessari og öðrum Öveffóttum, í hid mlufta er skjaldgjæft að þau tilfelli verði hættuleg í þesskonar sótt, hvorra hér ekki er gétid.

Reykjavík Skrifstofa í Júlíó 1834.

J. Thorsteinson.

